

Glossariy:

Briologiya – moxlarning tuzilishi, rivojlanishi, tarqalishi, ahamiyati kabi masalalarni o‘rganadigan botanika fanining tarmog‘i.

Jinsiy ko‘payish – suvo‘tlar (masalan, moxlar)da ikkita hujayraning qo‘shilib, zigota hosil qilishi va undan zoosporalarning yuzaga kelishi jarayoni.

Ikki uylilik – erkak va urg‘ochi gametalarni turli organizmlarda rivojlanishi. Bunda gametalar bir-biridan ajralib, turli organlarda hosil bo‘ladi.

Ildizpoya – poyaning yer ostida turadigan va tashqi ko‘rinish jihatidan ildizga o‘xshab ketadigan qismi. Odatda o‘simlikning yer osti tizimi bo‘lib, oziq moddalari va suvni olishda rol o‘ynaydi.

Relikt o‘simlik – qadimgi zamonlardan buyon saqlanib qolgan o‘simlik. Bu o‘simliklar o‘zining evolyutsion tarixida kam o‘zgarishlarga duchor bo‘lgan va ba‘zan faqat cheklangan hududlarda uchraydi.

Rizoid – bir yoki bir necha birin-ketin joylashgan hujayralardan iborat tallomni substratga biriktirish uchun xizmat qiladigan tuk. U tolasimon hosila bo‘lib, suv va oziq moddalarni shimadi. Moxlar, lishayniklar va ayrim suvo‘tlarda uchraydi.

Rizosfera – o‘simlik ildiziga bevosita yopishgan tuproqlar. Bu hududda o‘simliklar tomonidan olingan oziq moddalar va mikroorganizmlar bilan o‘zaro aloqalar sodir bo‘ladi.

Rizosfera – yuksak o‘simliklarning ildiz va ildiz tuklari atrofidagi tirik organizmlar majmui. Bu hududda o‘simliklar, mikroorganizmlar va boshqa tirik organizmlar o‘zaro aloqada bo‘lib, o‘simliklarning oziqlanishi va o‘shiga yordam beradi.